

รายงานการกันโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕

บทางโทรศัพท์บัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕

๑. นำสุนัขไปรักษาด้วยวิธีการฉีดวัคซีนและยาเม็ดสุนัข อายุได้ ๒ - ๔ เดือน และคงต่อไป ตามที่กำหนดในปรับปรุงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๒. เมื่อสักวันได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมายประจำตัว และเก็บไว้บริเวณการฉีดวัคซีนไว้ การเขย่า หรือให้สูบชูก็ต้องห้องอยู่เป็นร่องให้ด้วย

๓. โดยเฉพาะสัตว์ที่มีไข้เครียดอย่างหนักเจ้าหน้าที่จับจัง ๕ วันไม่สนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ ไม่ปล่อยสัตว์ออกมานะสักวันเดียว

๔. เมื่อสัตว์อาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้แจ้งต่อ สัตวแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ๒๙ ท่าน

ท่านกำลังทำผิดต่อสังคมอย่างใหญ่หลวงถ้าท่าน



วิสดร.คสบ

บ้องกับโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เสีย



๑๖๘

สัตวแพทย์ไนน์ ไทรานา

ด้วยความปราณedaดิจาก
สำนักปลัด
องค์กรบริหารส่วนตำบลเว่อ
เบอร์โทร ๐๘๑-๗๘๐๗๘๘



- ปล่อยสุนัขของท่าน เนื้อพานในสาธารณรัฐ โดยไม่ได้ลงทะเบียนไว้ตามกฎหมาย
- เดินด้วยรากศีริ สีเหลือง
- ปะปิดเมืองสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่สักวันเดียว
- เพราะสุนัขนี้ ยังคงไว้อีกพิษสุนัข แล้วก่ออันตรายในภัยเหล่านี้
- นำสุนัขไปปล่อยตามสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โรงเรียน เป็นการหลอกภัยให้ผู้คน

กฎหมาย

การติดต่อ และการพักระจากของโรคพิษสุนัขบ้า

จะส่งเข้าสักวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า
ได้อย่างไร

เจ้าของสุนัขที่สูบฉ่ายออกบ้านหรือมีเด็กเล่นสุนัขไว้ แม่ค้าคนเมือง
บอกล่าวก่อนเข้าบ้านมีไฟ ดังนี้

๑. ทางแพ่ง ต้องขอใช้คำเสียหาย เช่น ค่ารักษาพยาบาลบาดแผล
ค่าศรีษะ ค่าหูน้ำปีบองกันโรคสุนัขบ้า ค่าซ่อมบำรุงบ้านเด็กและ
ผู้ใหญ่ก็เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า อาจต้องเสียค่าปลงศพ รวมไปถึง
ค่าจุราจรเรียกบุตร ให้แก่ บุตรผู้เสียหาย

๒. หากอาชญากรรมตามมา ๑ เดือนหรือ ประมาณ ๑๐๐๐.-
บาท หรือผู้จัดทำเงินรับ

สัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

สัตว์ที่ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะขับเหื่องลงมากับน้ำลายเป็น
รูปปีศาจ เสื้อไว้รั่วสีโรคพิษสุนัขบ้าในน้ำลายสีฟ้าสู่ร่างกายคน
หรือสัตว์อื่นทางบาดแผล รอยตื้อช้ำน ราชพฤกษา เยื่อบุตา ไข้สูง ปาก

จะทำอย่างไรเมื่อสุนัขติดภัย

๑. ถางเหลาอย่างสุ่มคลายฯ ครึ่ง



๒. ให้ยารักษา หยุด แยกอยู่ตัว ใจซ้ายหัวซ้ายโรค อย่างใส่สิ่งอื่น

พบสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

๓. กักสัตว์ที่ติดได้จากการอย่างน้อย ๑๐ วัน เน้นแต่สัตว์นั้นติดร้าย

ก็คง หรือสัตว์นี้ หรือไม่สนใจหากก้าวสัมผัสร้ายๆ พาลาก ถ้าสัตว์พากัน
ให้อาสาตัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

๔. รีบไปหาแพทย์ หรือสัตวแพทย์ทันทีที่สูบฉ่าย เพื่อขอคำแนะนำ
เบิกบานกรณีติดเชื้อ และรักษาอย่างดีที่สุด แม้อัตราตาย
รีบตัดหัว สังหารโรคพิษสุนัขบ้า



๑. ตัดหัวสัตว์ วางคาดไอลูติพลาสติกหุ้มพากัน ใส่ถุงหุ้มทุก
ครั้งที่ตัดหัวสัตว์

๒. ใส่กระดาษ และสำลีไว้พยุงคลอดเวลา

๓. ส่งพร้อมประวัติสัตว์ ชนิด เพศ อายุ สี อาการป่วย ถือ^{หัว} จุจุลงสหัสฯ และผู้พูดคุย